

செய்தி குறிப்பு
மஞ்சள் காமாலை தடுப்புசிக் திட்டத்தை தமிழ் நாட்டில்
அறிமுகப்படுத்துதல்

தடுப்புசி திட்டத்தின் மூலம் தமிழ்நாட்டில் தொண்டை அடைப்பான், கக்குவான் இருமல், போலியோ, காச்சோய், தட்டம்மை மற்றும் ரணங்ஜன்னி ஆகிய நேரங்களை தடுக்க முறையான தவணைகளில் தடுப்புசிகள் வழங்கப்படுகின்றன. இதன் பயனாக தமிழ்நாட்டில் இந்த நோப்கள் முற்றிலுமாக குறைக்குவிட்டன. தடுப்புமருந்து திட்டத்தில் தமிழ்நாடு முன்னோடி மாநிலமாக திகழ்வதால் மத்திய அரசு மஞ்சள் காமாலை தடுப்புசினை நடைமுறைப்படுத்த தமிழ்நாட்டை தேர்வு செய்துள்ளது. ஆகவே மஞ்சள் காமாலை தடுப்புசி திட்டத்தை வெற்றிகரிமாக செயல்படுத்தி தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து முன்னிலை பேருச்செய்வதற்கு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

மஞ்சள் காமாலை-பி (செறப்படைட்டிஸ்-பி) பற்றிய சில தகவல்கள்:

நோயின் தன்மை:- செறப்படைட்டிஸ்-பி வைரஸ் மூலம் ஏற்படக்கூடிய மஞ்சள் காமாலை கல்வீரவைத் தாக்கி பின் மரணத்தை உண்டாக்கக்கூடிய ஆபத்தான நோயாகும். கல்வீரல் புற்று நோப்களில் 80 சதவீதம் செறப்படைட்டிஸ்-பி வைரஸால் ஏற்படுகிறது.

இந்தியாவில் ஏறக்குறைய 4 கோடியே ஐம்பது லட்சம் மக்கள் இந்த நோப்பத்தொற்று உடையவர்களாகவும் அவர்களில் ஒரு கோடுக்கு மேற்பட்டவர்கள் நோய் பாதிப்பத்தும் ஆளாகிறார்கள். தமிழ் நாட்டில் ஏறக் குறைய 6 லட்சம் பேர்கள் இந் நோப்பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறார்கள்.

நோயின் அறிகுறிகள்:- பரியின்மை, சோஷு, வாந்தி, வயிற்றுவசி, தோலில் தழுப்புகள் (தோல், கண், சிறுநீர் மஞ்சள் நிறத்துடன் காணப்படுவது), மற்றும் மூட்டு வளி ஆகியன இந்நோயின் அறிகுறிகள் ஆகும்.

நோய் பரவும் முறை:- செறப்படைட்டிஸ்-பி வைரஸ் ஓருவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு இரத்தம், உபிழிர், மற்றும் பிறப்பு உறுப்புகளிலிருந்து வெளிவரும் திரவங்கள் மூலம் பரவுகிறது.

நோய் தடுப்பு:- இந்த நோயிடர்ந்து பாதுகாப்பு பெற வசதியுள்ள பெற்றோர்கள் தலையார் மறுத்துவர்கள் மூலம் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு மஞ்சள் காமாலை-பி தடுப்புசி போட்டுக்கொள்கின்றனர். விலை கூடுதலான இந்த தடுப்புசினை எல்லா குழந்தைகளுக்கும் கிடைக்கக்கூடிய வேண்டும். என்ற உயரிய நோக்கத்துடன் தமிழக அரசு வரும் ஜனவரி 6 ஆம் தேதி முதல் இத்திட்டத்தை தமிழகம் முழுவதும் ரூ 7.20 கோடி செலவில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளது.

மஞ்சள் காமாலை-பி தடுப்புசிக்கான கால அட்டவணை:

குழந்தை பிறந்தவுடன் (அ) 15 நாட்களுக்குள் முதல் தவணையும், வெது வாரம் 2 ஆம் தவணையும், 14 வது வாரம் 3 ஆம் தவணையும் கொடுக்க வேண்டும்.

மஞ்சள் காமாலை-பி தடுப்புசி எங்கு வழங்கப்படுகிறது:

மஞ்சள் காமாலை-பி தடுப்புசி அரசு மறுத்துவமணைகள், ஆரம்ப ககாதூர் நிலைபாங்கள் யற்றும் துணை ககாதூர் நிலையங்களில் போடப்படும் ஆண்டொன்றுக்கு கமர் 12 லட்சம் ஒரு வயதிற்குப்பட்ட குழந்தைகள் மஞ்சள் காமாலை-பி தடுப்புசியினால் பயன்படுவார்கள்.

ஹசிக்குமில்கள்:

ஒரு முறை மட்டுமே உபயோகிக்கத் தக்க ஹசிக் குழல்கள் மஞ்சள் காமாலை-பி தடுப்புசி போப்படுத்தப்படுகிறது. எல்லா குழந்தைகளுக்கும் பாதுகாப்பான ஹசி போடுவது இரண் மூலம் உறுதி செய்யப்படுகிறது.

அனைத்து பெற்றோர்களும் ஒரு வயதிற்குப்பட்ட தங்கள் குழந்தைகளுக்கு தவறாமல் மூன்று தவணைகள் மஞ்சள் காமாலை-பி தடுப்புசி போட்டுக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்களின் சீரிய முயற்சியால் இத்திட்டம் தமிழகத்திற்கு கிடைத்துள்ளது. மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்கள் ஜனவரி 6 ஆம் நாள் இத்திட்டத்தை தொடக்கிவைக்கின்றன. 2-3-3-3-